

2023年及2024年疾病预防及治疗情况

月份	规格	易发病情	采取措施	常规药品用量
1月份	所有鱼	水温降低，平均水温6℃左右。鱼摄食量减少，鱼体抵抗力降低，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月1次。	一、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶）。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱（泼洒）
2月份	所有鱼	水温降低，平均水温4-6℃左右。鱼摄食量减少，鱼体抵抗力降低，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月1次。	一、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶）。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱（泼洒）
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料加肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
3月份	所有鱼	水温降低，平均水温4℃左右。鱼摄食量减少，鱼体抵抗力降低，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、每月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月1次。	一、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶）。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱（泼洒）
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患烂鳃、胀鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。

4月份	所有鱼	水温回升至6℃以上，细菌性疾病容易感染，三代虫易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中和下旬所有网箱挂水霉净预防水霉2次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次	一、水霉净20-30瓶/箱（挂瓶）。 二、每立方水体聚维酮碘1ppm。
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周一次，投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
5月份	所有鱼	水温回升至9℃以上，细菌性疾病容易感染，三代虫易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中、下旬所有网箱挂水霉净预防水霉1次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵, 连续7天。	一、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶）。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱（泼洒） 三、分箱前后苗肝胆多维拌料2g/kg投喂7天
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。及时更换网衣，降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15克。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。

6月份	所有鱼	水温升至16℃左右，细菌性疾病容易感染，易烂鳃，三代虫易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强。投喂、分箱等易发生机械损伤，进而造成细菌感染。	一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	一、每立方水体聚维酮碘1ppm 二、分箱前后的苗肝胆多维2g/kg拌料投喂7天。
	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。鱼苗每天境检1次	指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
7月份	所有鱼	水温升至18℃左右，细菌性疾病容易感染，易烂鳃，小瓜虫、三代虫易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤，进而造成细菌感染。	一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	每立方水体聚维酮碘1ppm.
	50g以下	三代虫、小瓜虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋，投喂瓜虫净预防小瓜虫。鱼苗每天境检1次	一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克，连续投喂10天

	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。
8月份	所有鱼	水温升至20℃以上, 细菌性疾病容易感染, 易烂鳃, 小瓜虫、三代虫易感染。鱼摄食量减少, 鱼体免疫力降低, 应减少投喂量, 减少投喂次数, 避免应激反应造成死亡。投喂、洗网等易发生机械损伤产生细菌感染。	一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶/箱, 连续5天, 每月2次 二、鱼苗每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵, 连续7天。	每立方水体聚维酮碘1ppm.
	50g以下	小瓜虫、三代虫易感染	保持网衣清洁, 每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次, 投喂指环虫K粉预防三代虫。槟榔和辣椒挂袋, 投喂瓜虫净预防小瓜虫。鱼苗每天镜检1次。	一、指环虫K粉每公斤饲料10g-15g。连续投喂10天。 二、瓜虫净每公斤饲料10克-15克, 连续投喂10天
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。
	所有鱼	水温下降至18℃左右, 细菌性疾病容易感染, 三代虫易感染。鱼摄食量开始增加, 鱼体免疫力开始增强, 洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤, 造成细菌感染。	一、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月2次 二、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵, 连续7天。	每立方水体聚维酮碘1ppm.

9月份	50g以下	三代虫易感染	保持网衣清洁，每月洗网2次以上。降低养殖密度。指环虫清挂药每周1次，投喂指环虫K粉预防三代虫。	指环虫K粉每公斤饲料10g。连续投喂10天。
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。可同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
10月份	所有鱼	水温降至15℃左右，细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	一、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶）。 二、聚维酮碘2-4瓶/箱（泼洒） 三、分箱前后苗肝胆多维拌料2g/kg投喂7天
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵，各连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。
11月份	所有鱼	水温降至11℃左右，细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始增加，鱼体免疫力开始增强，洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次； 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶，连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵，连续7天。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料，肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、水霉净30-45瓶/箱（挂瓶） 三、盐浴浓度1%-2%，盐浴时间30分钟-60分钟。

	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料。同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。
12月份	所有鱼	水温降至8℃左右, 细菌性疾病容易感染。鱼摄食量开始下降, 鱼体免疫力开始减弱, 洗网、投喂、分箱等易发生机械损伤产生水霉病。	一、月中旬所有网箱挂水霉净预防水霉一次; 二、投喂同时每个网箱泼洒聚维酮碘2-4瓶, 连续5天。每月2次 三、鱼苗分箱前后每公斤饲料拌肝胆多维2g药饵, 连续7天。	一、水霉净20-30瓶/网箱。(挂瓶) 二、每立方水体聚维酮碘1ppm.
	5g以下鱼苗	上浮鱼苗因水质变化易患胀鳃、烂鳃	一、加强水质管理, 关注理化指标变化。 二、月初和月中投喂三黄散和肝胆多维药饵, 连续7天。 三、鱼苗胀鳃严重可以盐浴。	一、三黄散3克-5克/公斤饲料, 肝胆多维2克/公斤饲料, 同时投喂。 二、盐浴浓度1%-2%, 盐浴时间30分钟-60分钟。